

Ревакцинация от COVID-19

Редакция от 20 января 2022 г.

Russian | Русский

О ревакцинации (бустерной дозе) от COVID-19

Бустерная доза от COVID-19 – это повторная прививка от COVID-19 после полного курса первичной вакцинации (обычно из двух компонентов), когда защита от вируса **уже ослабела**.

Зачем ревакцинироваться?

Когда защита, полученная после первых двух доз, уже ослабела, бустерная доза усиливает защиту от:

- заражения COVID-19
- тяжелого течения болезни
- смерти от COVID-19

Сегодня для максимальной защиты от COVID-19 рекомендуется следующая схема: две первичных дозы и одна бустерная через 3 месяца для большинства людей.

Кому полагается бустерная доза?

Бустерная доза доступна всем, кому уже есть 18 лет и кто привит вторым компонентом вакцины от COVID-19 более трех месяцев назад.

Кому не стоит делать бустерную дозу?

На сегодня ревакцинация не рекомендована:

- тем, кому от 12 до 17 лет
- тем, у кого сильно ослаблен иммунитет и кому уже сделана прививка третьей дозой.

Ревакцинация бесплатна?

Да.

В чем разница между бустерной и третьей дозой?

Те, у кого сильно ослаблен иммунитет, могли получить от врача рекомендацию привиться дополнительной дозой вакцины – так называемой третьей дозой. Это могло быть связано, например, с курсом лечения от рака или перенесенной пересадкой органа. Такая дополнительная доза призвана повысить иммунный ответ в дополнение к первичной вакцинации у людей с сильно ослабленным иммунитетом, чья иммунная система не справляется с защитой организма от вирусов и прочих болезней.

Когда можно ревакцинироваться?

Привиться бустерной дозой можно как минимум через три месяца после второй прививки от COVID-19.

Чтобы определить дату, нужно к дате из сертификата о вакцинации прибавить 3 месяца. Например, если вторая прививка была 23 ноября, бустерную дозу можно делать с 23 февраля.

Как ревакцинироваться

Получить бустерную дозу можно в крупных центрах вакцинации в Мельбурне, у терапевта (GP) или в некоторых аптеках. Одна из таких клиник – клиника StarHealth в мэрии Прарана (Prahran Town Hall).

По телефону 1800 675 398 можно записаться на ревакцинацию или узнать, где сделать бустерную дозу без записи.

Какими вакцинами проводится ревакцинация?

В большинстве случаев вакциной бустерной дозы будет Pfizer. Вакциной Pfizer можно смело ревакцинироваться независимо от вакцины первых двух прививок.

Вакциной AstraZeneca могут ревакцинироваться те, кто:

- не может прививаться мРНК-вакцинами по медицинским показаниям или
- уже привит двумя дозами вакцины AstraZeneca.

Если вы не уверены, какая бустерная доза вам подойдет, поговорите с врачом-терапевтом (GP).

От бустерной дозы бывают те же обычные легкие побочные эффекты, что и от первых двух прививок.

Будет ли бустерная доза отражена в сертификате о вакцинации?

Электронный сертификат о вакцинации обновляется после введения каждой дозы вакцины – и третьей дозы для иммунокомпromетированных, и бустерной дозы. Новую распечатку сертификата можно попросить в отделении Medicare; также, возможно, помочь смогут терапевт или фармацевт.

Бустерная доза также вносится в Австралийский реестр иммунизации (Australian Immunisation Register).

Ревакцинация обязательна?

Нет. Ревакцинироваться не обязательно, но настоятельно рекомендуется, чтобы не ослабевал иммунитет от COVID-19.

Работодателю обязательно сообщать о ревакцинации?

Нет. Сейчас нет требования сообщать работодателю о ревакцинации или третьей дозе для работников тех отраслей, где прививка от COVID-19 обязательна.

Мне нужно больше информации.

Отличный источник информации о бустерных дозах и вакцинах вообще – врач-терапевт (GP) или фармацевт в ближайшей аптеке.

Больше узнать о ревакцинации от COVID-19 можно по телефону 1800 675 398 или на сайте <https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-your-vaccination/booster-doses>

**ПОДСТАВЬ ПЛЕЧО -
ЗАЩИТИСЬ ОТ COVID-19**

australia.gov.au COVID-19 VACCINATION

